



Istituto di ricerca in Malattie Neurodegenerative
Fondazione O.N.L.U.S.

“Dec

Descrizi

S

- 1 Fondazione Lino Maestroni – ONL
- 2 Dipartimento di Sanità Pubblica e

La demenza è una malattia lun
incapacità cognitiva. La durata

in Medicina Palliativa “L. Maestroni”
..U.S.

Decisioni critiche e con demenza zione dello studio

Silvia Finetti¹, Francesca Pettenati¹, Paolo

ONLUS – Istituto di Ricerca in Medicina Pal
e Microbiologia – Università degli Studi –

lunga, altamente invalidante e dalla
ata media è incerta e varia, a seco

di fine vita nell'area grave". lio e dati preliminari

Paola Di Giulio², Franco Toscani¹

Palliativa- Cremona
i – Torino

alla prognosi infausta, che porta a ter
conda degli studi, da 3 a 9 anni. S

'anziano

inari

a totale dipendenza ed
Spesso, date le gravi

incapacità cognitiva. La durata
condizioni, i pazienti affetti da
inseriti in progetti di assistenza
La demenza grave è a tutti g
ma i pochi dati disponibili in le
raramente viene considerata t
riceve cure palliative ottimali.
sui trattamenti a cui veng
nell'ultima fase di vita; in partic
l'approccio sia tendenzialment

Da queste premesse, allo s
cliniche critiche prese su una
avanzata, nasce lo studio Eol
On DEmentia Care. Sono sta
un campione di 496 pazienti c

	TUTTI			FAST 7AB	
	RSA n=315	Dom n=181	p	RSA n=70	Dom n=16
^ Anni da	000	150		07	11

ata media è incerta e varia, a seco
da questa patologia ricevono ricov
nza domiciliare.

ti gli effetti una malattia terminale,
n letteratura suggeriscono che solo
a tale e, sovente, chi ne soffre non
li. In Italia non esistono dati relativi
ngono sottoposti questi pazienti
rticolare non è noto se
ente interventista o palliativista.

scopo di descrivere le decisioni
na coorte di pazienti con demenza
Eolo - PSODEC: *Prospective Study*
state visionate le cartelle cliniche di
i con stadio FAST (*Functional Asse*

		FAST 7C-F		
Dom 16	p	RSA n=315	Dom n=181	p
44		200	115	

ricoverati in
rappresentativo
di cure domicil

condita degli studi, da 3 a 9 anni. S
 overo presso strutture protette (RS

le,
 lo
 on
 tivi
 nti
 oni
 za
 dy
 di

	TUTTI			FAST 7AB	
	RSA n=315	Domiciliari n=181	p	RSA n=70	Domiciliari n=16
Sesso (%)					
M	15.2	30.9	0.0001	22.9	43.7
F	84.8	69.1		77.1	56.3
Età					
Media ± SD	84.5±8.4	87.0±7.3	0.0007*	84.3±8.0	82.9±6
Range	53-106	61-101		60-99	66-94

essment Stage) ≥7,

in un campione

tivo di RSA lombarde oppure inser

ciliari in 5 distretti dell'Emilia Romagna

Caratteristiche anagrafiche della p

* Mann-Whitney test

Spesso, date le gravi
(RSA) oppure vengono

B		FAST 7C-F		
Domiciliari n=16	p	RSA n=245	Domiciliari n=165	p
43.7	NS	13.1	29.7	0.0001
56.3		86.9	70.3	
79.9±6.9	NS*	84.5±8.5	87.4±7.2	0.0003*
6-94		53-106	61-101	

della popolazione
test

eriti in un programma
magna, per 6 mesi.

^ Anni da diagnosi	n=306	n=159		n=67	n=14
Media±SD	6.9±4.6	6.9±4.1	NS*	6.0±4.9	6.9±6.6
Range	0-42	0-27		0-27	1-27
Tipo di demenza (%)					
Alzheimer	40.0	22.1	0.0001	37.1	25.0
Vascolare	29.5	29.3	NS	30.0	12.5
Mista	22.5	32.6	0.014	27.1	37.5
Non definita	5.4	12.2	0.007	5.7	12.5
Frontotemporale	0.6	0.6	NS	---	---
Corpi di Lewy	0.3	1.7	NS	---	12.5
Altro	1.6	1.7	NS	---	---

Diagnosi e tipo di demenza

*Mann-Whitney test

^Informazione non disponibile per 9 pazienti di RSA e per 2

caratteristiche anagrafi

	RSA			
	TUTTI n=315		FAST 7 a,b n=70	
Nutrizione	n	%	n	%
PEG	15	4.8	1	1.4
SNG	12	3.8	-	-
Idratazione EV/SC *	46	31.9	6	31.6

14		n=239	n=145	
-6.6	NS*	7.2±4.5	6.9±3.9	NS*
27		0-42	0-25	
10.0	NS	40.8	21.8	0.0001
10.5	NS	29.4	30.9	NS
10.5	NS	21.2	32.1	0.013
10.5	NS	5.3	12.1	0.013
-	---	0.8	0.6	NS
10.5	0.0028	0.4	0.6	NS
-	---	2.0	1.8	NS

Di ciascun p
 anagrafiche, d
 terapie
 farmacologiche
 tutte le va
 cliniche rileva
 le relative de
 terapeutiche
 dai medici.

Vengo

e per 22 domiciliari

presentati i dati rela

afiche e cliniche del campione al ba

a,b	Domiciliari							
	FAST 7 c-f n=245		TUTTI n=181		FAST 7 a,b n=16		FAST 7 c-f n=165	
%	n	%	n	%	n	%	n	%
10.4	14	5.7	15	8.3	1	6.2	14	8.5
-	12	4.9	3	1.7	-	-	3	1.8
10.6	40	32.0	28	62.2	2	-	26	63.4

paziente sono state registrate
diagnosi e stadiazione della demen-

che e
variazioni
vanti con
decisioni
prese
ngono qui
relativi alle
baseline.

	TUTTI		p	FAST	
	RSA n=315	Dom n=181		RSA n=70	Dom n=181
Cardiache	48.9	50.8	NS	57.1	50.8
Dermatologiche	8.9	11.1	NS	12.9	11.1
Vascolari e ictus	36.5	30.4	NS	28.6	30.4
Metaboliche	24.4	21.6	NS	21.4	21.6
Neurologiche	43.2	43.1	NS	28.6	43.1
Oncologiche	9.2	5.5	NS	8.6	5.5
Muscolo- scheletriche	64.4	26.0	0.0001	70.0	26.0
Psichiatriche	14.6	8.3	0.039	10.0	8.3
Respiratorie	15.9	12.7	NS	10.0	12.7

ragna, per 6 mesi.

ate le caratteristiche
menza, comorbidità e

FAST 7AB			FAST 7C-F		
RSA n=70	Dom n=16	p	RSA n=245	Dom n=165	p
51.4	50.0	NS	46.5	50.9	NS
12.9	12.5	NS	7.8	10.9	NS
25.6	25.0	NS	38.8	30.9	NS
18.4	18.8	NS	25.3	21.8	NS
43.6	43.8	NS	47.3	43.0	NS
12.6	12.5	NS	9.4	4.9	NS
18.0	18.8	0.0002	62.9	26.7	0.0001
12.0	12.5	NS	15.9	7.9	0.016
6.0	6.3	NS	17.6	13.3	NS

Idratazione EV/SC *	46	31.9	6	31.6
Riabilitazione	78	24.8	31	44.3
Ossigeno-terapia	14	4.4	4	5.7
Catetere vescicale	38	12.1	5	7.1
Enterostomia	2	0.6	-	-
CVC (non alimentare)	1	0.3	-	-
Contenzione **	286	90.8	59	84.3
Spondine	278	88.3	60	85.7
Contenz.addome	148	47.0	28	40.0
Altro	16	5.2	4	5.7

Trattamenti
* p< 0.0001
** Uno o più tipi di contenzione

XVII Congresso Nazionale SICP, Roma 2010

.6	40	32.0	28	62.2	2	-	26	63.4
.3	47	19.2	7	3.9	-	-	7	4.2
.7	10	4.1	7	3.9	-	-	7	4.2
.1	33	13.5	113	62.4	9	56.3	104	63.0
-	2	0.8	1	0.6	-	-	1	0.6
-	1	0.4	-	-	-	-	-	-
.3	227	92.7	121	66.8	9	56.3	112	67.9
5.7	218	89.0	-	-	-	-	-	-
0.0	120	49.0	-	-	-	-	-	-
.7	12	4.9	2	1.1	-	-	2	1.2

ne

Respiratorie	15.9	12.7	NS	10.0
Settiche	1.6	1.1	NS	---
Urologiche	27.3	23.8	NS	28.6
Anchilosi/ contratture	59.4	39.2	0.0001	25.7
Decubiti	17.1	33.3	0.0001	7.1
Altro	25.1	11.1	0.0002	24.3

Patolog

0.0	6.3	NS	17.6	13.3	NS
---	---	---	2.0	1.2	NS
0.6	37.5	NS	26.9	22.4	NS
0.7	12.5	NS	69.0	41.8	0.0001
1	25.0	0.035	20.0	34.2	0.0013
0.3	25.0	NS	25.3	9.7	0.0001

patologie concomitanti

istitutomaestroni@fastpiu.it
www.istituto.org